

予防接種 接種時期、間隔(標準接種)

令和6年4月1日現在

定期 又は 任意	対象疾患	ワクチン	接種対象 期間	月齢・年齢																																
				出生	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳 (12)	1.1歳 (13)	1.2歳 (14)	1.3歳 (15)	1.4歳 (16)	1.5歳 (17)	1.6歳 (18)	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7.6歳							
定期	小児の肺炎球菌	不活化	生後2か月～5歳未満			①	②	③	3回目終了後60日以上、1歳～1.3歳の間に追加1回接種											追加																
				27日以上の間隔で3回接種																																
定期	B型肝炎	不活化	生後2か月～1歳未満			①	②	1回目接種から139日(20週)以上経過後3回目接種											③																	
				27日以上の間隔で2回接種																																
定期	ロタウイルス	生	生後2か月～24週未満(32週未満)	生後14週6日までに1回目を接種	①	②	③	ロタリックスは2回、24週未満 ロタテックは3回、32週未満											※医療機関によって取扱いワクチンが制限されることがあります																	
					27日以上の間隔で2回または3回																															
定期	五種混合	不活化	生後2か月～7歳6か月未満	※R6年4月1日から定期接種化	①	②	③	3回目終了後6か月～18か月の間隔をあけて追加1回接種											追加																	
					20～56日の間隔で3回接種																											※小学6年生で2期1回接種				
定期	BCG	生	生後5か月～1歳未満																																	
					①																															
定期	麻しん風しん	生	生後1歳～2歳未満	小学校就学前1年間(4/1～3/31)																																
																															②					
定期	水痘	生	生後1歳～3歳未満																																	
定期	日本脳炎	不活化	生後3歳～7歳6か月未満																																	
任意	おたふく	生	生後1歳～																																	
任意	インフルエンザ	不	生後6か月～																																	

※生ワクチン注射の後、別の生ワクチン注射を受ける場合は、27日以上間隔をあける。
 ※新型コロナワクチンについては、前後に他の予防接種を受ける場合、13日以上の間隔を空け、他の予防接種との同時接種はできない。

定期	ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)	不活化	小学6年生～高校1年生(12～16歳)	2価	①	②	③	※H25年から積極的勧奨を差し控えていたが、R3年11月から積極的勧奨が再開。 標準接種期間は中学1年生に属する1年間		
					1か月以上	1回目接種から6か月以上				
				4価	①	②	③			
				2か月以上	1回目接種から6か月以上					
				9価	1回目の接種が15歳未満の場合	①	6か月以上	②		
					1回目の接種が15歳以上の場合	①	2か月以上	②	1回目接種から6か月以上	③