小児の定期予防接種 【種類・接種時期・間隔（標準接種）】

令和8年4月1日現在

対象疾患	ワクチン	接種対象期間	標準的な接種期間及び間隔
小児の肺炎球菌	不活化	生後2か月～5歳未満	①②③ 27日以上の間隔で3回接種（3回目終了後60日以上、かつ1歳以上で追加1回接種）→ **追加**（1歳（12））
B型肝炎	不活化	1歳未満	①② 27日以上の間隔で2回接種 → 1回目接種から139日（20週）以上経過後3回目接種 → ③
ロタウイルス	生	ロタリックス 6週～24週未満 ロタテック 6週～32週未満	生後14週6日までに1回目を接種 → ①②③ 27日以上の間隔で2回または3回（ロタリックスは2回、24週未満／ロタテックは3回、32週未満） ※医療機関によって取扱いワクチンが制限されることがあります
ヒブ	不活化	生後2か月～5歳未満	①②③ 27日以上の間隔で3回接種（3回目終了後、7か月～13か月の間で追加1回接種）→ **追加**（1歳（12））
五種混合	不活化	生後2か月～7歳6か月未満	※R6年4月1日から定期接種化 → ①②③ 20～56日の間隔で3回接種（3回目終了後6か月～18か月の間隔をあけて追加1回接種）→ **追加**（1歳（12））
二種混合	不活化	11歳～13歳未満	① 11歳～12歳の間
BCG	生	1歳未満	① 生後5か月から8か月までに1回接種
麻しん風しん	生	生後1歳～2歳未満	①
		小学校就学前1年間（4/1～3/31）	②
水痘	生	生後1歳～3歳未満	① 1回目終了後6か月～1年の間隔をあけて接種 ②
日本脳炎（第1期）	不活化	生後6か月～7歳6か月未満	3歳未満での接種は接種量が違うため注意 → ① 6～28日 ② 追加 2回目終了後概ね1年（11か月以上）で接種
（第2期）	不活化	9歳～13歳未満	① 9歳～10歳

※茅野市では、小6で個別通知しています。

※茅野市では、小4で個別通知しています

ヒトパピローマウイルス（子宮頸がん）	不活化	小学6年生～高校1年生相当 ※茅野市では、中1で個別通知予定	1回目の接種が15歳未満の場合 ① 6か月以上 ②	※左記の間隔で接種ができない場合（2回接種）：5か月以上の間隔をあけて2回接種
			1回目の接種が15歳以上の場合 ① 2か月以上 ② 1回目接種から6か月以上 ③	※左記の間隔で接種ができない場合（3回接種）：1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をあけて1回接種

※生注射ワクチンの接種後、別の生注射ワクチンを受ける場合は、27日以上間隔をあける。